

МАСТАК

Стойкий до гербіцидів, що містять трибенурон-метил (SU) - 50 г/га. Відрізняється стабільно високою врожайністю та максимальною наповненістю кошика.

Морфологічні та агрономічні характеристики

Група стиглості Ранньостиглий
Вегетаційний період 100-105 дн.
Висота рослини 165 см
Діаметр кошика 25 см
Вміст олії 51 %
Потенціал врожайності 58 ц/га
Форма кошика Плеската
Нахил кошика До низу, під 45°

Стойкість до хвороб та стресових факторів

Полягання	9/9	●●●●●●●●●●
Посухостійкість	9/9	●●●●●●●●●●
Осіпання	9/9	●●●●●●●●●●
Фомоз	9/9	●●●●●●●●●●
Фомопсис	9/9	●●●●●●●●●●
Іржа	7/9	●●●●●●●○
Несп. борошниста роса..	7/9	●●●●●●●○
Сіра гниль	8/9	●●●●●●●○
Біла гниль.....	8/9	●●●●●●●○
Вовчок соняшниковий ...	A-E	●●●●●●●●●●

Рекомендована густота стояння рослин перед збиранням

Достатнє зволоження 55-60 тис. рослин/га
Помірне зволоження 55 тис. рослин/га
Недостатнє зволоження..... 50-52 тис. рослин/га



SU-технологія,
100-105 днів

Врожайність гібрида в ґрунтово-кліматичних умовах, 2024 рік

