


SU-технологія,
110 днів



Врожайність гібрида
в ґрунтово-кліматичних умовах, 2024 рік



АМАТО

Стійкий до гербіцидів, що містять трибенулон-метил (SU) — 50 г/га. Придатний для екстенсивної технології вирощування. Має високу стійкість до основних хвороб, стійкий до вовчка соняшникового рас А-Г.

Морфологічні та агрономічні характеристики

Група стиглості	Середньостиглий
Веgetаційний період	110 дн.
Висота рослини.....	170 см
Діаметр кошика	22 см
Вміст олії	50 %
Потенціал врожайності	52 ц/га
Форма кошика	Випукла
Нахил кошика.....	Напіввіднятий

Стійкість до хвороб та стресових факторів

Полягання.....	9/9	●●●●●●●●●●
Посухостійкість	9/9	●●●●●●●●●●
Осіпання	9/9	●●●●●●●●●●
Фомоз	8/9	●●●●●●●●○
Фомопсис	8/9	●●●●●●●●○
Іржа	8/9	●●●●●●●●○
Несп. борошніста роса..	9/9	●●●●●●●●●●
Сіра гниль	8/9	●●●●●●●●○
Біла гниль.....	9/9	●●●●●●●●●●
Вовчок соняшниковий ...	А-Г	●●●●●●●●○

Рекомендована густота стояння рослини перед збиранням

Достатнє зволоження	60-65 тис. рослин/га
Помірне зволоження	55-60 тис. рослин/га
Недостатнє зволоження.....	45-50 тис. рослин/га