

SU-технологія,
100-105 днів




МАСТАК

Стійкий до гербіцидів, що містять трибенурун-метил (SU) — 50 г/га. Відрізняється максимальною виповненістю кошика, отже, стабільною високою врожайністю. Високий показник натурн зерна.

Морфологічні та агрономічні характеристики

- Група стиглості Ранньостиглий
Вегетаційний період 100-105 дн.
- Висота рослини..... 170 см
Діаметр кошика 25 см
Вміст олії 51 %
Потенціал врожайності 58 ц/га
- Форма кошика Злегка випукла
Нахил кошика..... Донизу, під 45°

Врожайність гібрида в ґрунтово-кліматичних умовах, 2024 рік



Стійкість до хвороб та стресових факторів

Полягання.....	9/9	
Посухостійкість	9/9	
Осіпання	9/9	
Фомоз	9/9	
Фомопсис.....	9/9	
Іржа	7/9	
Несп. борошніста роса..	7/9	
Сіра гниль	8/9	
Біла гниль.....	8/9	
Вовчок соняшниковий ...	A-E	

Рекомендована густота стояння рослини перед збиранням

- Достатнє зволоження 55-60 тис. рослин/га
Помірне зволоження 55 тис. рослин/га
Недостатнє зволоження..... 45-50 тис. рослин/га