

SU-технологія,
100-105 днів



Врожайність гібрида
в ґрунтово-кліматичних умовах за останні роки

Одеська обл.
Роздільнянський р-н

29,6 ц/га

Житомирська обл.
Бердичівський р-н

34,2 ц/га

Черкаська обл.
Звенигородський р-н

41,5 ц/га

Чернігівська обл.
Ніжинський р-н


34,3 ц/га

Кіровоградська обл.
Кропивницький р-н

31,5 ц/га

Дніпропетровська обл.
Кам'янський р-н

41,2 ц/га



ПАНЧО



Стійкий до гербіцидів, що містять трибенурон-метил (SU) — 50 г/га. Гібрид формує потужні рослини та забезпечує рівномірний розвиток навіть за контрастних умов сезону. Має стійкість до вовчка рас А-Г, що гарантує впевнену роботу на полі без ризиків втрати врожаю. Панчо створений для господарств, які очікують прогнозованого результату на будь-яких ґрунтах.

Морфологічні та агрономічні характеристики

Група стиглості Ранньостиглий
Веgetаційний період 100-105 дн.

Висота рослини 145-186 см
Діаметр кошика 23 см
Вміст олії 53,7 %
Потенціал врожайності 56 ц/га

Форма кошика Сильно опукла
Нахил кошика Напівобернений
донизу

Стійкість до хвороб та стресових факторів

Полягання	7/9	●●●●●●○○
Посухостійкість	9/9	●●●●●●●●
Осіпання	9/9	●●●●●●●●
Фомоз	7/9	●●●●●○○○
Фомопсис	7/9	●●●●●○○○
Іржа	8/9	●●●●●●○○
Несп. борошниста роса..	7/9	●●●●●○○○
Сіра гниль	8/9	●●●●●○○○
Біла гниль	9/9	●●●●●●●●
Вовчок соняшниковий ...	А-Г	●●●●●○○○

Рекомендована густота стояння рослини перед збиранням

Достатнє зволоження 55-60 тис. рослин/га
Помірне зволоження 52-55 тис. рослин/га
Недостатнє зволоження 45-50 тис. рослин/га