

SU-технологія,
100-105 днів



Врожайність гібрида в ґрунтово-кліматичних умовах, 2024 рік

Одеська обл.
Роздільнянський р-н

29,6 ц/га

Житомирська обл.
Бердичівський р-н

34,2 ц/га

Черкаська обл.
Звенигородський р-н

41,5 ц/га

Чернігівська обл.
Ніжинський р-н


34,3 ц/га

Кіровоградська обл.
Кропивницький р-н

31,5 ц/га

Дніпропетровська обл.
Кам'янський р-н

41,2 ц/га



ПАНЧО



Гібрид позитивно реагує на підвищену вологість, формуючи потужні рослини та забезпечуючи рівномірний розвиток навіть за контрастних умов сезону. Має стійкість до вовчка рас А-Г, що гарантує впевнену роботу на полі без ризиків втрати врожаю. Панчо створений для господарств, які очікують прогнозованого результату на будь-яких ґрунтах.

Морфологічні та агрономічні характеристики

Група стиглості Ранньостиглий
Веgetаційний період 100-105 дн.

Висота рослини 145-186 см
Діаметр кошика 23 см
Вміст олії 53,7 %
Потенціал врожайності 56 ц/га

Форма кошика Сильно випукла
Нахил кошика Напівобернений
донизу

Стійкість до хвороб та стресових факторів

Полягання.....	9/9	
Посухостійкість	7/9	
Осіпання	9/9	
Фомоз	7/9	
Фомопсис	7/9	
Іржа	8/9	
Несп. борошніста роса..	9/9	
Сіра гниль	8/9	
Біла гниль.....	9/9	
Вовчок соняшниковий ...	A-G	

Рекомендована густота стояння рослин перед збиранням

Достатнє зволоження 55-60 тис. рослин/га
Помірне зволоження 52-55 тис. рослин/га
Недостатнє зволоження..... 45-50 тис. рослин/га