

# ШЕНОН

Стойкий до гербіцидів, що містять трибенурон-метил (SU) — 50 г/га. Virізняється стабільно високою врожайністю та максимальною виповненістю кошика за екстенсивної технології вирощування. Стойкий до вилягання.

## Морфологічні та агрономічні характеристики

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Група стиглості .....       | Середньостиглий |
| Вегетаційний період .....   | 110-115 дн.     |
| Висота рослини.....         | 165-170 см      |
| Діаметр кошика .....        | 23-25 см        |
| Вміст олії .....            | 52 %            |
| Потенціал врожайності ..... | 58 ц/га         |
| Форма кошика .....          | Злегка випукла  |
| Нахил кошика.....           | Напівнахилений  |

## Стойкість до хвороб та стресових факторів

|                         |     |           |
|-------------------------|-----|-----------|
| Полягання .....         | 8/9 | ●●●●●●●○  |
| Посухостійкість .....   | 9/9 | ●●●●●●●●● |
| Осіпання .....          | 9/9 | ●●●●●●●●● |
| Фомоз .....             | 9/9 | ●●●●●●●●● |
| Фомопсис .....          | 8/9 | ●●●●●●●○  |
| Іржа .....              | 9/9 | ●●●●●●●●● |
| Несп. борошниста роса.. | 9/9 | ●●●●●●●●● |
| Сіра гниль .....        | 8/9 | ●●●●●●●○  |
| Біла гниль.....         | 8/9 | ●●●●●●●○  |
| Вовчок соняшниковий ... | A-F | ●●●●●●○○○ |

## Рекомендована густина стояння рослини перед збиранням

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Достатнє зволоження .....  | 55-60 тис. рослин/га |
| Помірне зволоження .....   | 50-55 тис. рослин/га |
| Недостатнє зволоження..... | 40-45 тис. рослин/га |



SU-технологія,  
110-115 днів

## Врожайність гібрида в ґрунтово-кліматичних умовах, 2024 рік

