


NEW




### Морфологічні та агрономічні характеристики



155 см



15 см



50 %



45 ц/га

Форма кошика

злегка випукла

Нахил кошика

напівнахилений

### Рекомендована густина на час збирання (рослин/га)



Достатнє зволоження  
55-60 тис.



Помірне зволоження  
52-55 тис.



Недостатнє зволоження  
50-52 тис.

# Тенет

Толерантний до основних хвороб, зокрема до несправжньої борошнистої роси, фомопсису й ін. Стійкий до вилягання. Відзначається високою та стабільною врожайністю. Пластичний до термінів посіву

### Особливості гібриду

Група стиглості	ранньостиглий
Вегетаційний період	100-105 дн.
Гербицидна технологія	SU
Терміни посіву	ранні, оптимальні, пізні
Система обробітку ґрунту	традиційна, mini-till, strip-till, no-till

### Стійкість до хвороб та стресових факторів

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A-G
Полягання										
Посухостійкість										
Осіпання										
Фомоз										
Фомопсис										
Іржа										
Несправжня борошниста роса										
Сіра гниль (ботритис)										
Біла гниль (склеротиніоз)										
Вовчок соняшниковий										

### Результати урожайності демо посівів

(урожайність, перерахована на стандартну вологість 7%)

Рік	Регіон	Урожайність, ц/га
2023	Таврівський р-н, Вінницька обл.	36,8
2023	Бахмацький р-н, Чернігівська обл.	41,2
2023	Звенигородський р-н, Черкаська обл.	34
2022	Маньківський р-н, Черкаська обл.	42,2
2023	Запорізький р-н, Запорізька обл.	50,2
2023	Обухівський р-н, Київської обл.	31,9