

SU-технологія,
105-108 днів



Врожайність гібрида
в ґрунтово-кліматичних умовах, 2024 рік

Одеська обл.
Роздільнянський р-н

24 ц/га

Черкаська обл.
Звенигородський р-н

41,3 ц/га

Чернігівська обл.
Ніжинський р-н


46 ц/га

Дніпропетровська обл.
Кам'янський р-н

38,4 ц/га

Житомирська обл.
Бердичівський р-н

43,5 ц/га



КЕНТАВР

Середньоранній SU-гібрид із вегетаційним періодом 105–108 днів, потенціалом урожайності до 50 ц/га та олійністю близько 50 %. Завдяки високій стійкості до посухи й полягання гібрид забезпечує стабільний результат у різних ґрунтово-кліматичних умовах.

Морфологічні та агрономічні характеристики

Група стиглості	Середньоранній
Веgetаційний період	105-108 дн.
Висота рослини.....	166 см
Діаметр кошика	20-22 см
Вміст олії	50 %
Потенціал врожайності	58 ц/га
Форма кошика	Злегка випукла
Нахил кошика.....	Напівнахилений донизу

Стійкість до хвороб та стресових факторів

Полягання.....	9/9	●●●●●●●●●●
Посухостійкість	9/9	●●●●●●●●●●
Осипання	9/9	●●●●●●●●●●
Фомоз	7/9	●●●●●●●●○
Фомопсис	7/9	●●●●●●●●○
Іржа	7/9	●●●●●●●●○
Несп. борошніста роса..	7/9	●●●●●●●●○
Сіра гниль	7/9	●●●●●●●●○
Біла гниль.....	9/9	●●●●●●●●●●
Вовчок соняшниковий ...	A-G+	●●●●●●●●○

Рекомендована густота стояння рослини перед збиранням

Достатнє зволоження	50-60 тис. рослин/га
Помірне зволоження	50-55 тис. рослин/га
Недостатнє зволоження.....	45-50 тис. рослин/га