

МАСТАК

Стойкий до гербіцидів, що містять трибенурун-метил (SU) — 50 г/га. Відрізняється стабільно високою врожайністю та максимальною виповненістю кошика. Високий показник натурн зерна.

Морфологічні та агрономічні характеристики

Група стиглості Ранньостиглий
Вегетаційний період 100-105 дн.
Висота рослини 170 см
Діаметр кошика 25 см
Вміст олії 51 %
Потенціал врожайності 58 ц/га
Форма кошика Злегка випукла
Нахил кошика Донизу, під 45°

Стійкість до хвороб та стресових факторів

Полягання	9/9	●●●●●●●●●●
Посухостійкість	9/9	●●●●●●●●●●
Осипання	9/9	●●●●●●●●●●
Фомоз	9/9	●●●●●●●●●●
Фомопсис	9/9	●●●●●●●●●●
Іржа	7/9	●●●●●●●●○
Несп. борошниста роса..	7/9	●●●●●●●●○
Сіра гниль	8/9	●●●●●●●●○
Біла гниль.....	8/9	●●●●●●●●○
Вовчок соняшниковий ...	A-E	●●●●●●○

Рекомендована густота стояння рослини перед збиранням

Достатнє зволоження 55-60 тис. рослин/га
Помірне зволоження 55 тис. рослин/га
Недостатнє зволоження..... 45-50 тис. рослин/га



Врожайність гібрида в ґрунтово-кліматичних умовах, 2024 рік

