

КЕНТАВР



Гібрид вирізняється високою стійкістю до посухи та вилягання. Веgetаційний період дозволяє отримувати стабільні, прогнозовані врожаї та оптимізувати технологічні операції в полі. Олійність близько 50 % та потенціал урожайності до 50 ц/га забезпечують конкурентний економічний результат.

Морфологічні та агрономічні характеристики

Група стиглості	Середньоранній
Веgetаційний період	105-108 дн.
Висота рослини	166 см
Діаметр кошика	20-22 см
Вміст олії	50 %
Потенціал урожайності	50 ц/га
Форма кошика	Злегка випукла
Нахил кошика	Напівнахилений донизу

Стійкість до хвороб та стресових факторів

Полягання	9/9	●●●●●●●●●●
Посухостійкість	9/9	●●●●●●●●●●
Осипання	9/9	●●●●●●●●●●
Фомоз	7/9	●●●●●●●●○
Фомопсис	7/9	●●●●●●●●○
Іржа	7/9	●●●●●●●●○
Несп. борошниста роса..	7/9	●●●●●●●●○
Сіра гниль	7/9	●●●●●●●●○
Біла гниль	9/9	●●●●●●●●●●
Вовчок соняшниковий ...	A-G+	●●●●●●●●○

Рекомендована густота стояння рослин перед збиранням

Достатнє зволоження	50-60 тис. рослин/га
Помірне зволоження	50-55 тис. рослин/га
Недостатнє зволоження	45-50 тис. рослин/га



SU-технологія,
105-108 днів

Врожайність гібрида в ґрунтово-кліматичних умовах, 2024 рік

