

АМАТО

Стійкий до гербіцидів, що містять трибенулон-метил (SU) — 50 г/га. Придатний для екстенсивної технології вирощування. Має високу стійкість до основних хвороб, стійкий до вовчка соняшникового рас А-Г.

Морфологічні та агрономічні характеристики

Група стиглості Середньостиглий
 Веgetаційний період 110 дн.
 Висота рослини 180 см
 Діаметр кошика 22 см
 Вміст олії 50 %
 Потенціал врожайності 52 ц/га
 Форма кошика Випукла
 Нахил кошика Напівпіднятий

Стійкість до хвороб та стресових факторів

Полягання	9/9	●●●●●●●●●●
Посухостійкість	9/9	●●●●●●●●●●
Осипання	9/9	●●●●●●●●●●
Фомоз	8/9	●●●●●●●●○
Фомопсис	8/9	●●●●●●●●○
Іржа	8/9	●●●●●●●●○
Несп. борошниста роса..	9/9	●●●●●●●●●●
Сіра гниль	8/9	●●●●●●●●○
Біла гниль.....	9/9	●●●●●●●●●●
Вовчок соняшниковий ...	А-Г	●●●●●●●●○

Рекомендована густина стояння рослини перед збиранням

Достатнє зволоження 60-65 тис. рослин/га
 Помірне зволоження 55-60 тис. рослин/га
 Недостатнє зволоження..... 45-50 тис. рослин/га

SU-технологія,
110 днів



Врожайність гібрида в ґрунтово-кліматичних умовах, 2024 рік

