

ІМІ-технологія,
100-102 дні



Врожайність гібрида в ґрунтово-кліматичних умовах, 2024 рік

Київська обл.
Обухівський р-н

32 ц/га

Черкаська обл.
Маньківський р-н

37,8 ц/га

Запорізька обл.
Запорізький р-н


33,7 ц/га

Вінницька обл.
Таврівський р-н

38 ц/га

Дніпропетровська обл.
Кам'янський р-н

31,2 ц/га



ІНТЕРКРУС



Вегетаційний період 100-102 дні дає можливість раннього збирання та ефективного обороту площ. Має високу стійкість до полягання та осипання. Високий потенціал урожайності. Стійкий до вовчка соняшникового рас А-G+.

Морфологічні та агрономічні характеристики

Група стиглості Ранньостиглий
Вегетаційний період 100-102 дн.

Висота рослини..... 154 см
Діаметр кошика 20 см
Вміст олії 50 %
Потенціал врожайності 55 ц/га

Форма кошика Злегка випукла
Нахил кошика..... Напівнахилений
донизу

Стійкість до хвороб та стресових факторів

Полягання.....	9/9	
Посухостійкість	7/9	
Осипання	9/9	
Фомоз	7/9	
Фомопсис	7/9	
Іржа	7/9	
Несп. борошниста роса..	7/9	
Сіра гниль	7/9	
Біла гниль.....	9/9	
Вовчок соняшниковий ...	A-G+	

Рекомендована густота стояння рослини перед збиранням

Достатнє зволоження 50-60 тис. рослин/га
Помірне зволоження 50-55 тис. рослин/га
Недостатнє зволоження..... 40-45 тис. рослин/га