


NEW



Морфологічні та агрономічні характеристики



165 см



25 см



51 %



58 ц/га

Форма кошика

злегка випукла

Нахил кошика

нахилений до низу, під кутом 45°

Рекомендована густина на час збирання (рослин/га)



Достатнє зволоження
55-60 тис.



Помірне зволоження
55 тис.



Недостатнє зволоження
50-52 тис.

Мастак

Стійкий до гербіцидів, що містять трибенурон-метил (SU) – 50 г/га.

Вирізняється стабільно високою врожайністю та максимальною виповненістю кошика.

Особливості гібриду

| | |
|--------------------------|--|
| Група стиглості | ранньостиглий |
| Вегетаційний період | 100-105 дн. |
| Гербіцидна технологія | SU |
| Терміни посіву | ранні, оптимальні, пізні |
| Система обробітку ґрунту | традиційна, mini-till, strip-till, no-till |

Стійкість до хвороб та стресових факторів

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A-E |
|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| Полягання | | | | | | | | | | |
| Посухостійкість | | | | | | | | | | |
| Осіпання | | | | | | | | | | |
| Фомоз | | | | | | | | | | |
| Фомопсис | | | | | | | | | | |
| Іржа | | | | | | | | | | |
| Несправжня борошниста роса | | | | | | | | | | |
| Сіра гниль (ботритис) | | | | | | | | | | |
| Біла гниль (склеротиніоз) | | | | | | | | | | |
| Вовчок соняшниковий | | | | | | | | | | |

Результати урожайності демо посівів

(урожайність, перерахована на стандартну вологість 7%)

| Рік | Реґіон | Урожайність, ц/га |
|-------|---|-------------------|
| 2021* | Чернігівська обл., Бахмацький р-н. | 41 |
| 2021* | Київська обл., Таращанський р-н. | 38 |
| 2021* | Рівненська обл., Костопільський р-н. | 34 |
| 2022* | Кіровоградська обл., Кропивницький р-н. | 44 |
| 2023 | Вінницька обл., Теплицький р-н. | 37 |
| 2023 | Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н. | 43 |
| 2023 | Кіровоградська обл., Гайворонський р-н. | 36 |

*Макроділянки