



КАТАЛОГ ГІБРИДІВ 2025

КУКУРУДЗА

КУКУРУДЗА

Обирай своє. Якісне.

Компанія ВНІС досягла значних успіхів в селекції гібридів кукурудзи за напрямками використання на зерно та силос. З року в рік гібриди кукурудзи селекції ВНІС показують високу та стабільну врожайність. Селекційна лінійка кукурудзи представлена гібридами з ФАО від 270 до 370. Гібриди кукурудзи ВНІС — з підвищеним вмістом крохмалю.

Вагомими перевагами гібридів кукурудзи компанії ВНІС є:

- високий потенціал врожайності;
- швидка вологовіддача;
- посухо- та холодостійкість;
- широкий спектр гібридів, адаптованих до різних технологій вирощування;
- високий рівень пластичності та адаптивності до умов вирощування.

Гібриди кукурудзи ВНІС екологічно пластичні в різних ґрунтово-кліматичних умовах України і стабільні по врожайності на невисоких агрофонах.

Знаходьте більше інформації про гібриди кукурудзи ВНІС на нашому сайті за посиланням: vnis.com.ua



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ

* 1 бал — min
9 балів — max

Назва гібриду	Група стиглості	ФАО	Напрямок використання	Морфологічні та агрономічні характеристики					Структура врожаю		Стійкість до хвороб та стресових факторів*					Рекомендована густота перед збиранням, тис. рослин/га		
				Тип зерна	Висота рослини, см	Висота кріплення качана, см	Середня врожайність за роки випробування, т/га	Потенціал врожайності, т/га	Кількість рядів зерен у качані, шт.	Кількість зерен у ряду, шт.	Гельмінтоспоріоз	Фузаріоз	Пухирчаста сажка	Виліягання	Посухостійкість	Зона достатнього зволоження	Зона помірного зволоження	Зона недостатнього зволоження

Середньоранні гібриди кукурудзи (ФАО 200-299)

 ПАРADІЗ	середньоранній	270	зерновий, силосний	кременисто-зубовидний	250	110	13,5	19	18-20	40-42	9	9	8	9	9	70-72	60-65	40-45
 ВН 63	середньоранній	280	зерновий, силосний	кременисто-зубовидний	270	100	10,8	15,5	16	35-40	8	7	7	8	8	78-80	60-65	40-45
 ГАЛАРДО	середньоранній	280	зерновий, силосний	зубовидний	250	100-110	13,2	19	16-18	35-43	8	9	9	9	8	70-80	60-70	50-55

Середньостиглі гібриди кукурудзи (ФАО 300-399)

 ГРАН 6	середньостиглий	300	зерновий, силосний	кременисто-зубовидний	260	98	11	15,9	16-18	35-40	8	8	7	7	8	75-78	60-65	40-45
 БЕЙЛІС	середньостиглий	310	зерновий, силосний	зубовидний	260	105-115	13,6	19,5	16-18	36-41	8	8	9	8	9	70-80	60-70	50-55
 МАНТІКОРА	середньостиглий	320	зерновий, силосний, біогаз	кременисто-зубовидний	250	120	14	21	16-18	44	9	8	8	9	9	70-72	60-65	40-45
 ВН 6763	середньостиглий	320	зерновий, силосний	кременисто-зубовидний	250-260	95-100	11,5	18	16-18	40-42	8	7	7	8	8	75-78	60-65	40-45
 АМАРОК 290	середньостиглий	320	зерновий, силосний, біогаз	кременисто-зубовидний	270	95-110	11	15,8	16-18	35-40	9	8	9	9	8	75-78	60-65	40-45
 РОНІН	середньостиглий	330	зерновий, силосний, біогаз, біоетанол	зубовидно-подібний	250	95	12,5	18	16-18	35-40	9	9	8	9	9	75-78	60-65	40-45
 ТЕСЛА	середньостиглий	350	зерновий, силосний, біогаз	кременисто-зубовидний	260-280	100-110	12,5	18	18-20	39-45	8	9	8	8	9	70-72	60-65	40-45
 ГРАН 1	середньостиглий	370	зерновий, силосний, біогаз	кременисто-зубовидний	260-270	100-110	12	16	18-20	40-46	8	7	7	8	8	70-75	60-65	40-45

ФАО 270,
Середньоранній

ПАРАДІЗ

Пластичний гібрид зернового напрямку використання. Стійкий до вилягання. Характеризується високою посухостійкістю та стійкістю до хвороб. Підвищений вміст крохмалю. Швидка вологовіддача.

Морфологічні та агрономічні характеристики

ФАО 270
Напрямок використання Зерновий, силосний

Висота рослини..... 250 см
Висота кріплення качана 110 см
Потенціал врожайності 19 т/га

Кількість рядів зерен 18-20 шт.
Кількість зерен у ряду..... 40-42 шт.

Врожайність гібрида в ґрунтово-кліматичних умовах, 2024 рік



ВН 63

Гібрид має підвищену толерантність до посушливих умов. Придатний для вирощування в усіх зонах як за інтенсивною технологією, так і за технологією мінімального обробітку ґрунту. Дуже швидка вологовіддача.

Морфологічні та агрономічні характеристики

ФАО 280
Напрямок використання Зерновий, силосний

Висота рослини..... 270 см
Висота кріплення качана 100 см
Потенціал врожайності 15,5 т/га

Кількість рядів зерен 16 шт.
Кількість зерен у ряду..... 35-40 шт.

Стійкість до хвороб та стресових факторів


Гельмінтоспоріоз 8/9 
Фузаріоз 7/9 
Пухирчаста сажка 7/9 
Вилягання 8/9 
Посухостійкість 8/9 

Рекомендована густота стояння рослини перед збиранням

Достатнє зволоження 78-80 тис. рослин/га
Помірне зволоження 60-65 тис. рослин/га
Недостатнє зволоження 40-45 тис. рослин/га

ФАО 280,
Середньоранній


Врожайність гібрида в ґрунтово-кліматичних умовах, 2024 рік



ФАО 280,
Середньоранній



Врожайність гібрида
в ґрунтово-кліматичних умовах, 2024 рік



ГАЛАРДО



Високий потенціал урожайності. Має безпечний ранній старт навесні. Максимальна стійкість до вилягання. Висока резистентність до основних хвороб.

Морфологічні
та агрономічні характеристики

ФАО	280
Напрямок використання	Зерновий, силосний
Висота рослини.....	250 см
Висота кріплення качана	100-110 см
Потенціал врожайності	19 т/га
Кількість рядів зерен	16-18
Кількість зерен у ряду.....	35-43

Стійкість до хвороб
та стресових факторів

Гельмінтоспоріоз.....	8/9	●●●●●●●○
Фузаріоз	9/9	●●●●●●●●●
Пухирчаста сажка	9/9	●●●●●●●●●
Вилягання	9/9	●●●●●●●●●
Посухостійкість	8/9	●●●●●●●○

Рекомендована густота стояння рослини
перед збиранням

Достатнє зволоження	70-80 тис. рослин/га
Помірне зволоження	60-70 тис. рослин/га
Недостатнє зволоження.....	50-55 тис. рослин/га

ГРАН 6

Пластичний гібрид зернового напрямку використання. Надзвичайно швидка вологовіддача після настання фізіологічної стиглості. Підвищений вміст крохмалю. Стабільний за різних умов вирощування. Підходить для вирощування за технологією обробітку ґрунту No-Till.

Морфологічні
та агрономічні характеристики

ФАО	300
Напрямок використання	Зерновий, силосний
Висота рослини.....	260 см
Висота кріплення качана	98 см
Потенціал врожайності	15,9 т/га
Кількість рядів зерен	16-18 шт.
Кількість зерен у ряду.....	35-40 шт.

Стійкість до хвороб
та стресових факторів

Гельмінтоспоріоз.....	8/9	●●●●●●●○
Фузаріоз	8/9	●●●●●●●○
Пухирчаста сажка	7/9	●●●●●●○
Вилягання	7/9	●●●●●●○
Посухостійкість	8/9	●●●●●●○


Рекомендована густота стояння рослини
перед збиранням

Достатнє зволоження	75-78 тис. рослин/га
Помірне зволоження	60-65 тис. рослин/га
Недостатнє зволоження.....	40-45 тис. рослин/га

ФАО 300,
Середньостиглий



Врожайність гібрида
в ґрунтово-кліматичних умовах, 2024 рік



ФАО 310,
Середньостиглий

БЕЙЛІС




Характеризується швидкою вологовіддачею. Добре реагує на мінеральне підживлення, що дає змогу ефективно використовувати інтенсивні технології. Стабільна врожайність у різних агрокліматичних зонах.

Морфологічні та агрономічні характеристики

ФАО 310
Напрямок використання Зерновий, силосний
Висота рослини..... 260 см
Висота кріплення качана 105-115 см
Потенціал врожайності 19,5 т/га
Кількість рядів зерен 16-18
Кількість зерен у ряду..... 36-41

Врожайність гібрида в ґрунтово-кліматичних умовах, 2024 рік



МАНТІКОРА

Пластичний гібрид зернового напрямку використання. Придатний для отримання біогазу. Високий потенціал урожайності. Підвищений вміст крохмалю.

Морфологічні та агрономічні характеристики

ФАО 320
Напрямок використання Зерновий, силосний, біогаз
Висота рослини..... 250 см
Висота кріплення качана 120 см
Потенціал врожайності 21 т/га
Кількість рядів зерен 16-18 шт.
Кількість зерен у ряду..... 44 шт.

Врожайність гібрида в ґрунтово-кліматичних умовах, 2024 рік

Гельмінтоспоріоз 9/9
Фузаріоз 8/9
Пухирчаста сажка 8/9
Виліягання 9/9
Посухостійкість 9/9


Рекомендована густота стояння рослини перед збиранням

Достатнє зволоження 70-72 тис. рослин/га
Помірне зволоження 60-65 тис. рослин/га
Недостатнє зволоження 40-45 тис. рослин/га

ФАО 320,
Середньостиглий



Врожайність гібрида в ґрунтово-кліматичних умовах, 2024 рік



ФАО 320,
Середньостиглий

ВН 6763

Має потужне стебло, що зумовлює високу стійкість до вилягання. Має підвищений вміст крохмалю. Придатний для вирощування в усіх зонах як за інтенсивною технологією, так і за технологією мінімального обробітку ґрунту. Високий потенціал урожайності.


Морфологічні та агрономічні характеристики

ФАО 320
Напрямок використання Зерновий, силосний

Висота рослини..... 250-260 см
Висота кріплення качана 95-100 см
Потенціал врожайності 18 т/га

Кількість рядів зерен 16-18 шт.
Кількість зерен у ряду..... 40-42 шт.

Врожайність гібрида в ґрунтово-кліматичних умовах, 2024 рік



АМАРОК 290

Має високий потенціал урожайності. Характеризується високим виходом як зерна, так і зеленої маси. Толерантний до посухи. Підвищений вміст крохмалю. Гібрид адаптивний для вирощування в різних ґрунтово-кліматичних умовах.

Морфологічні та агрономічні характеристики

ФАО 320
Напрямок використання Зерновий, силосний, біогаз

Висота рослини..... 270 см
Висота кріплення качана 95-110 см
Потенціал врожайності 15,8 т/га

Кількість рядів зерен 16-18 шт.
Кількість зерен у ряду..... 35-40 шт.

Стійкість до хвороб та стресових факторів


Гельмінтоспоріоз 9/9
Фузаріоз 8/9
Пухирчаста сажка 9/9
Вилягання 9/9
Посухостійкість 8/9

Рекомендована густота стояння рослини перед збиранням

Достатнє зволоження 75-78 тис. рослин/га
Помірне зволоження 60-65 тис. рослин/га
Недостатнє зволоження 40-45 тис. рослин/га

ФАО 320,
Середньостиглий

Врожайність гібрида в ґрунтово-кліматичних умовах, 2023 рік



ФАО 330,
Середньостиглий

РОНІН



Пластичний гібрид широкого напрямку використання. Придатний для отримання біогазу та біоетанолу. Високий потенціал урожайності. Швидка вологовіддача та висока стійкість до основних хвороб. Має хорошу посухостійкість та стійкість до вилягання.


Морфологічні
та агрономічні характеристики

ФАО 330
Напрямок використання Зерновий, силосний
біогаз, біоетанол

Висота рослини..... 250 см
Висота кріплення качана 95 см
Потенціал врожайності 18 т/га

Кількість рядів зерен 16-18 шт.
Кількість зерен у ряду..... 35-40 шт.

Врожайність гібрида
в ґрунтово-кліматичних умовах, 2024 рік



ТЕСЛА

Стабільний гібрид широкого напрямку використання. Оптимальне поєднання ремонтантності, високої врожайності та швидкої вологовіддачі. Підвищений вміст крохмалю. Характеризується дуже високою посухостійкістю, найкращий у своїй групі стиглості.


Морфологічні
та агрономічні характеристики

ФАО 350
Напрямок використання Зерновий,
силосний, біогаз

Висота рослини..... 260-280 см
Висота кріплення качана 100-110 см
Потенціал врожайності 18 т/га

Кількість рядів зерен 18-20 шт.
Кількість зерен у ряду..... 39-45 шт.

Врожайність гібрида
в ґрунтово-кліматичних умовах, 2024 рік



Стойкість до хвороб
та стресових факторів

Гельмінтоспоріоз 9/9
Фузаріоз 9/9
Пухирчаста сажка 8/9
Вилягання 9/9
Посухостійкість 9/9

Рекомендована густота стояння рослини
перед збиранням

Достатнє зволоження 75-78 тис. рослин/га
Помірне зволоження 60-65 тис. рослин/га
Недостатнє зволоження 40-45 тис. рослин/га

Стойкість до хвороб
та стресових факторів


Гельмінтоспоріоз 8/9
Фузаріоз 9/9
Пухирчаста сажка 8/9
Вилягання 8/9
Посухостійкість 9/9

Рекомендована густота стояння рослини
перед збиранням

Достатнє зволоження 70-72 тис. рослин/га
Помірне зволоження 60-65 тис. рослин/га
Недостатнє зволоження 40-45 тис. рослин/га

ФАО 350,
Середньостиглий

Врожайність гібрида
в ґрунтово-кліматичних умовах, 2024 рік



ФАО 370,
Середньостиглий

ГРАН 1

Високоврожайний гібрид, пластичний до різних умов вирощування. Стійкий до температурних стресів і нестачі вологи. Придатний для отримання біогазу та біоетанолу. Має підвищений вміст крохмалю.

Морфологічні та агрономічні характеристики

ФАО 370
Напрямок використання Зерновий, силосний, біогаз

Висота рослини..... 260-270 см
Висота кріплення качана 100-110 см
Потенціал врожайності 16 т/га

Кількість рядів зерен 18-20 шт.
Кількість зерен у ряду..... 40-46 шт.

Врожайність гібрида в ґрунтово-кліматичних умовах, 2024 рік

Хмельницька обл.
Чемеровецький р-н


12,2 т/га

Черкаська обл.
Корсунь-Шевченківський р-н

11,1 т/га

Львівська обл.
Золочівський р-н

14,5 т/га



НОВІ ГІБРИДИ КУКУРУДЗИ

ГАЛАРДО



ФАО 280




16-18 шт.



35-43 шт.



19 т/га



БЕЙЛІС



ФАО 310



16-18 шт.



36-41 шт.



19,5 т/га



РОНІН



ФАО 330



16-18 шт.



35-40 шт.



18 т/га



Стійкість до хвороб та стресових факторів

Гельмінтоспоріоз..... 8/9

Фузаріоз 7/9

Пухирчаста сажка..... 7/9


Вилягання..... 8/9

Посухостійкість 8/9

Рекомендована густота стояння рослини перед збиранням

Достатнє зволоження 70-75 тис. рослин/га
Помірне зволоження 60-65 тис. рослин/га
Недостатнє зволоження..... 40-45 тис. рослин/га

ДЛЯ НОТАТОК

This image shows a single page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical margin lines, text, or other markings on the page.



03022, Україна, м. Київ,
вул. Васильківська, 32

www.vnis.com.ua

+38 (044) 507-11-70
info@vnis.com.ua

Клієнтська підтримка:
0 800 302 032

(безкоштовно з мобільних
та стаціонарних телефонів
у межах України)